

17/02/2016

Rafael Osorio

Estimad@ Rafael

correcontuperro@gmail.com,

vetservsl@hotmail.com

Re: Enan de A.C.E.; un cruce

Motivo de la Visita

Visita programada para la escisión de la cabeza del fémur de la extremidad posterior izquierda.

Tratamiento

Se realiza un abordaje craneolateral y un abordaje a la cabeza del fémur que permite la realización de una osteotomía de la cabeza y cuello femoral. El cierre de la herida se realiza de forma rutinaria.

Comentario

Enan debe tomar Rimadyl 2mg/kg dos veces al día u otro aine similar durante las próximas 4 semanas. Enan debe mantener reposo durante los próximos 7 días, a partir de los cuales debe empezar a hacer paseos con correa de forma frecuente, estimulándole el uso de la extremidad. Sería conveniente a partir de la segunda o tercera semana que se le llevase a nadar si se puede o a hacer paseos más largos en cuestas para fomentar el apoyo y el incremento del uso de la extremidad. Me gustaría reevaluar a Enan dentro de 3 semanas.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos. Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.

Recibe un cordial saludo,

Carlos Macías DSAS(Orth)MRCVS
Juan Miguel Ramírez