



Centro Veterinario  
de Referencia  
Bahía de Málaga

17/02/2016

Rafael Osorio

Estimad@ Rafael

correcontuperro@gmail.com,

vetservsl@hotmail.com

**Re: Macri de A.C.E.; un cruce**

**Motivo de la Visita**

Visita programada para corrección de una luxación de rótula en la extremidad posterior derecha.

**Tratamiento**

Se realiza un abordaje craneolateral y se realiza una surclopastia en V. Se realiza una trasposición de la tuberosidad tibial hacia el aspecto lateral, que se fija con una aguja y un alambre a modo de banda de tensión. El cierre de la herida incluye una desmotomía y una imbricación del retinaculo lateral. Se realiza un control radiográfico postoperatorio, que muestra la correcta colocación de la rótula y de los implantes.

**Comentario**

Macri debe mantener reposo absoluto durante las próximas 6 semanas para evitar un fallo prematuro de los implantes, así como tomar Rimadyl 2mg/kg dos veces al día durante las próximas 3 semanas. Me gustaría reevaluar a Macri en 6 semanas para una valoración clínica.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos.

Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.

Recibe un cordial saludo,

Carlos Macías DSAS(Orth)MRCVS

Juan Miguel Ramírez



17/02/2016

Rafael Osorio

Estimad@ Rafael  
vetservsl@hotmail.com

correcontuperro@gmail.com,

**Re: Enan de A.C.E.; un cruce**

**Motivo de la Visita**

Visita programada para la escisión de la cabeza del fémur de la extremidad posterior izquierda.

**Tratamiento**

Se realiza un abordaje craneolateral y un abordaje a la cabeza del fémur que permite la realización de una osteotomía de la cabeza y cuello femoral. El cierre de la herida se realiza de forma rutinaria.

**Comentario**

Enan debe tomar Rimadyl 2mg/kg dos veces al día u otro aine similar durante las próximas 4 semanas. Enan debe mantener reposo durante los próximos 7 días, a partir de los cuales debe empezar a hacer paseos con correa de forma frecuente, estimulándole el uso de la extremidad. Sería conveniente a partir de la segunda o tercera semana que se le llevase a nadar si se puede o a hacer paseos más largos en cuestas para fomentar el apoyo y el incremento del uso de la extremidad. Me gustaría reevaluar a Enan dentro de 3 semanas.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos. Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.

Recibe un cordial saludo,

Carlos Macías DSAS(Orth)MRCVS  
Juan Miguel Ramírez



17/03/2016

Rafael Osorio

Estimad@ Rafael

correcontuperro@gmail.com, vetservsl@hotmail.com

**Re: Nano de A.C.E, un bóxer.**

**Motivo de la Visita**

Visita programada para cirugía de luxación medial de rótula en la extremidad posterior izquierda.

**Tratamiento**

Se realiza una trocoplastia en cuña y la trasposición de la tuberosidad tibial que se fija y estabiliza con agujas y una banda de tensión. Se coloca un vendaje compresivo por 24 horas tras la comprobación radiográfica.

**Comentario y Cuidados postoperatorio**

Verás a Nano mañana para retirarle el vendaje y a los 10 días para la retirada de las suturas. Nano debe tomar Meloxicam u otro aine similar durante las próximas dos semanas así como guardar reposo absoluto durante las próximas 6 semanas para evitar un fallo prematuro de los implantes. Tengo previsto reevaluar a Nano dentro de 6 semanas.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos. Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.

Recibe un cordial saludo,

Carlos Macías DSAS(Orth)MRCVS  
Juan Miguel Ramírez