

28/07/2016

Estimad@ Denise

Re: Choco de A.C.E, un perro de aguas.

Muchas gracias por remitirnos este caso.

Motivo de la Visita

Cojera del miembro anterior izquierdo y andar débil del tercio posterior.

Exploración

Choco muestra una cojera de leve a moderada del miembro anterior izquierdo, dolor a la flexión del carpo así como disminución del rango de movimiento en flexión. Muestra asimismo dolor a la manipulación de ambas caderas, particularmente la izquierda. Bajo sedación, tienen un signo de ortalani positivo de la cadera izquierda.

Pruebas complementarias:

Radiografías de caderas: sin alteraciones significativas para la raza y edad.

Radiografías de carpo izquierdo:

Presencia de inflamación de los tejidos blandos sobre todo en el aspecto dorso medial de la misma y entefitosis en la articulación carpobraquial e intercarpiana, así como una fractura del proceso estiloides del radio, sugiriendo un antiguo traumatismo de la articulación del carpo izquierdo.

Tratamiento

Meloxicam 0.1 mg/kg SID PO durante dos meses (por favor, parad si vómitos o diarreas).

Comentario

Choco ha recibido probablemente un traumatismo en su muñeca hace tiempo y una fractura del proceso estiloides del radio, así como probablemente lesiones en los ligamentos colaterales de la articulación carpobraquial. En un principio vamos a tratar con antiinflamatorios durante 2 meses y si la cojera persiste, probablemente necesite una artrodesis pancarpiana (fusión de la articulación del carpo).

En cuanto a su cadera, aunque a día de hoy no presente signos radiográficos de displasia de cadera, el dolor a la manipulación de las mismas y el signo de ortalani positivo sugiere que desarrollará displasia de cadera en el futuro, la cual está por ver si es clínicamente relevante o no.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos. Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.

Recibe un cordial saludo,

Juan Miguel Ramírez
Carlos Macías DSAS(Orth)MRCVS