

19/10/2016

Re: Braulio, un perrillo de ACE.

Muchas gracias por remitirnos este caso.

Motivo de la Visita

Visita programada para artrodesis bilateral del carpo al tener lesiones que le causan una marcha palmígrada.

Tratamiento

Se realizan abordajes cráneo-laterales a ambos antebrazos y se realiza una artrodesis pancarpiana con placas híbridas de artrodesis pancarpiana. Se coloca hueso esponjoso obtenido de ambos húmeros en la zona intra-articular para estimular la cicatrización ósea. Se colocan vendajes compresivos en ambas extremidades tras la comprobación radiográfica.

Comentario

El vendaje deberá cambiarse cada 5 días, manteniendo un vendaje similar durante las 3 primeras semanas. Braulio debe mantener reposo absoluto en una jaula o trasportín, evitando desplazamientos y haciendo uso de un arnés torácico para ayudarle a caminar y que no soporte casi peso en las extremidades anteriores. Braulio debe tomar Amoxicilina/Clavulánico 15mg/kg dos veces al día, así como Carprofeno 2mg/kg dos veces al día durante las próximas 2 semanas. Es fundamental que se mantenga el reposo, para evitar un fallo prematuro de los implantes, lo que llevaría al fracaso de las cirugías. El pronóstico con estas lesiones es reservado debido a la presencia bilateral de las mismas, aunque si se cumplen las instrucciones postoperatorias, podrá llevar una vida más que aceptable. Tengo previsto reevaluarlo dentro de 3 y 6 semanas para una revisión clínica y radiográfica respectivamente.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda.

Recibe un cordial saludo,

Carlos Macías Oliva