

30/11/2016

**Ref: "Lucas" ACE**

**Motivo de la Visita**

Dermatitis prurítica dorsal y otitis de meses o años de evolución.

**Exploración**

Forunculosis costrosa en cuello, dorso, flancos, tarsos y cola. Grietas y fisuras cerca de las almohadillas. Liquefacción en pabellones, canal eritematoso con descarga ceruminosa amarillenta.

**Pruebas diagnósticas**

Citología cutánea: neutrófilos++cocos+++

Citología auricular: malassezia+++

Tricogramas y raspados negativos a demodex y sarcoptes

**Diagnósticos diferenciales**

Forunculosis bacteriana y otitis secundaria a hipersensibilidad:

- Dermatitis alérgica a la picadura de la pulga
- Dermatitis atópica
- Alergia alimentaria
- Combinación

**Tratamiento y comentarios**

Control antipulgas: Bravecto comprimidos cada 12 semanas o Simparica cada mes.

Urbason 16mg: 2 comprimidos diarios durante 10 días seguidos de 1 comprimido diario durante 10 días seguido de 1 comprimido en días alternos durante 10 días.

Amoxicilina/clavulánico 875mg: 1 comprimido dos veces al día durante 6 semanas

Champú de clorhexidina al 3% (Pyoderm, Chlorex, Clorhexidin o similar): 2 veces a la semana

Conofite forte: 2 veces al día en ambos oídos durante 3 semanas

**Comentarios**

El tratamiento inicial es solamente sintomático. Está encaminado a controlar la infección profunda y a aliviar el prurito. He aconsejado inicialmente corticoide (4 semanas) porque es muy efectivo en reducir la inflamación crónica del folículo en los casos de forunculosis. Necesitará varias semanas de antibiótico (mínimo 6 semanas) hasta controlar por completo la infección.

Si la forunculosis se ha desarrollado a raíz de una infestación por pulgas puntual hace tiempo una vez controlada la forunculosis con el control antipulgas solamente debería mantenerse bien. Si por el contrario el prurito reaparece de nuevo al cesar el corticoide a pesar de la mejoría de la infección y el control antipulgas entonces tendremos que considerar la posibilidad de una dermatitis atópica o alergia alimentaria y en ese caso proceder a realizar pruebas de alergia, dieta de eliminación o tratamiento sintomático a largo plazo sustituyendo el corticoide por ciclosporina o Apoquel para el largo plazo.

Me gustaría revisar a Lucas dentro de 6 semanas si va evolucionando favorablemente, si por el contrario no mejora sería preferible revisarlo dentro de 3 semanas (estaré fuera de vacaciones del 23 de diciembre al 8 de enero).

También sería aconsejable que le realizarais una prueba de leishmania y erlichia por si acaso está incubando alguna de estas enfermedades y hay que modificar el tratamiento.

Recibe un cordial saludo

Mari Paz Gracia. Lda Vet. Cert VD.