

29/07/2014

Rafael Osorio

Estimad@ Rafael
vetservsl@hotmail.com

correcontuperro@gmail.com,

Re: Nobel, un perrillo de ACE

Motivo de la Visita

Retirada de placa de reconstrucción infectada para artrodesis pancarpiana.

Exploración

Dentro de las normas fisiológicas para la raza y edad salvo por la presencia de una muy severa inflamación de los tejidos blandos adyacentes a la articulación del carpo, y metacarpo-falangianas, así como la formación de un muy exuberante callo óseo alrededor del radio proximal, diáfisis radial radio distal e ídem en el caso del cúbito del mismo antebrazo. El callo óseo se extiende distalmente hasta alcanzar los metacarpos proximales. No existe movimiento en la articulación metacarpo-falangiana. Se observa una gran úlcera, ocupando toda la zona de la almohadilla palmar, la cual no existe. Otra úlcera ocupa el lugar de la almohadilla falangiana del dedo IV del miembro anterior derecho.

Exámenes complementarios

Radiografías ortogonales del carpo derecho: exuberante callo óseo alrededor de la articulación radio-carpiana, intercarpiana y carpometacarpiana. Presencia de osteolisis alrededor de todos los implantes presentes y fractura de la placa a nivel de la articulación intercarpiana.

Tratamiento

Se realiza un abordaje dorsal al carpo y se retira la placa de reconstrucción. Se toman varias muestras para cultivo y antibiograma de la zona y se lava abundantemente la herida. Al final de la cirugía se coloca un vendaje muy acolchado en la úlcera, con gasas estériles empapadas de furacine.

Dada la gran inflamación de los tejidos blandos alrededor de la articulación del carpo, el cierre de la herida se realiza con cierta tensión. Es recomendable pues cambiar los vendajes cada dos días durante los seis primeros días para evaluar la aparición de una gran inflamación, por un efecto torniquete de las suturas. Si éste es el caso, por favor, poneros en contacto con nosotros.

Tratamiento en casa:

- Amoxicilina-clavulánico: 20 mg/kg dos veces al día durante 1 semana (si el cultivo bacteriano de la zona de la placa aísla una bacteria sensible a éste antibiótico, prolongaremos el tratamiento durante al menos 4 semanas)
- Carprofeno: 2 mg/kg dos veces al día durante 3 semanas
- Cambiar vendajes con furacine una vez cada dos días durante los primeros seis días. Si la evolución es buena, entonces cambiar los vendajes cada 3 o 4 días.

Comentario

La osteomielitis de Nobel probablemente se cure una vez retirada la placa y con terapia antibiótica prolongada. La movilidad sin embargo de su carpo se quedará muy reducida, afectando incluso a la articulación carpo-falangiana.

En un principio me gustaría que te ocupases tú de la úlcera, cambiando los vendajes de furacine cada dos días durante los seis primeros días y luego cada 3-4 días. Cuando la herida cicatrice, por favor, que Nobel venga a vernos.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.

Recibe un cordial saludo,

Juan M Ramírez